

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR  
Azərbaycan Respublikası  
Səhiyyə Nazirliyi  
Farmakoloji və Farmakopeya  
Ekspert Şurasının sədri

\_\_\_\_\_ E.M.Ağayev

“10\_”\_Mart\_\_\_\_\_ 2015-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

**PROKTOSEDİL** məlhəm  
PROCTOSEDYL®

### **Tərkibi**

*Təsiredici maddə:* 1 q məlhəmin tərkibində 5,58 mq hidrokortizon-asetat, 10 mq framisetin-sulfat, 100 BV heparinin natrium duzu, 10 mq eskulozid, 10 mq etilaminobenzoat, 10 mq butilaminobenzoat vardır.

*Köməkçi maddələr:* xolesterol, duru parafin, ağ yumşaq parafin, polisorbət 80, propilenqlikol, polietilenqlikol 400, polietilenqlikol 4000, polietilenqlikol 1540.

### **Təsviri**

Demək olar ki, ağ rəngli (yaşıl-sarı çalarla) homogen yağsız kütlə.

### **Farmakoterapevtik qrupu**

Babasil əleyhinə kombinə olunmuş dərman.

**ATC kodu:** C05AX03

### **Farmakoloji xüsusiyyətləri**

Babasil və digər anorektal lokal xəstəliklərin müalicəsi üçün kombinə olunmuş preparat.

Hidrokortizon - iltihabəleyhinə təsirə malik kortikosteroiddir. İltihabın simptomlarını (ödem, ağrı, qızartı) azaldır.

Heparinin natrium duzu antikoagulyant təsirə malikdir. Babasilin trombotik ağırlaşmalarının qarşısını alır.

Framisetin sulfat - yerli istifadə üçün geniş spektrli təsirə malik antibiotikdir. Qrammüsbət və qrammənfi bakteriyalara münasibətdə aktivlik göstərir.

Eskulozid P vitamininə oxşardır, kapilyarların artmış kövrəkliyini azaldır.

Etilenaminobenzoat və butilaminobenzoat yerli ağrıkəsici və qaşınma əleyhinə təsir göstərir, anal sfinkterin spazmını azaldır.

Preparatın effekti qəbuldan bir neçə dəqiqə sonra başlayır.

### **İstifadəsinə göstərişlər**

Xarici və daxili babasil; residivlərin profilaktikası; perianal ekzema; proktit, arxa keçəcəyin çatı, babasilli xəstələrin əməliyyatdan əvvəl və sonra müalicəsi; doğuşdan sonra yaranan babasil.

### **Əks göstərişlər**

Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

Anorektal nahiyənin vərəm, virus, göbələk mənşəli zədələnməsi.

Hamiləlik və laktasiya dövrü.

Südəmə uşaqlarda istifadəsi.

Arterial hipertenziyası və ürək çatışmazlığı olanlarda ehtiyatla istifadə olunmalıdır.

### **İstifadə qaydası və dozası**

Məlhəmdən az miqdarda əl ilə qaşınma və ya ağrı nahiyəsinə səhər və axşam, həmçinin hər defekasiya aktından sonra çəkilir. Düz bağırsağ daxilinə yeritmək üçün applikatorla istifadə edilir. Applikator düz bağırsağa yeridildikdən sonra tub sıxılır və tədricən applikator çıxarılır. Məlhəm tək halda və ya rektal kapsullar ilə kombinə edilmiş şəkildə istifadə oluna bilər. Proktosedil qısa müddət ərzində (7 gün ) istifadə olunur.

### **Əlavə təsirləri**

Düz bağırsağ nahiyəsində diskomfort, preparata qarşı həssaslıq ola bilər. Yanğı hissi, selikli qişada quruluq, ikincili infeksiya yarana bilər. Proktosedil yüksək dozada və ya uzun müddət istifadə olunduqda hidrokortozonla əlaqədar ümumi əlavə təsirlər arta bilər.

### **Buraxılış forması**

Yerli istifadə üçün 10 q məlhəm, alüminium tublarda. 1 tub içlik vərəqə və plastik ucluqla birləşən karton qutuya qablaşdırılır.

### **Saxlanma şəraiti**

25°C-dən yuxarı olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

### **Yararlılıq müddəti**

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

### **Aptekdən buraxılma şərti**

Resepsiz buraxılır.

### **İstehsalçı**

Sanofi India Limited, Hindistan.