

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR  
Azərbaycan Respublikası  
Səhiyyə Nazirliyi  
Farmakoloji və Farmakopeya  
Ekspert Şurasının sədri

\_\_\_\_\_E.M.Ağayev

“\_10\_”\_Mart\_\_\_\_ 2015-cü il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

**SOFRADEKS** göz və qulaq damcısı  
SOFRADEX

### **Tərkibi**

*Təsiredici maddə:* 1 ml məhlulun tərkibində 5 mq framisetin-sulfat, 0,05 mq qramisidin, 0,5 mq deksametazon vardır.

*Köməkçi maddələr:* litium-xlorid, natrium-sitrat, limon turşusu monohidrat, feniletanol (feniletil spirti), denaturasiya olunmuş etanol 95 %, polisorbət 80, inyeksiya üçün su.

### **Təsviri**

Feniletil spirtinə xas qoxusu olan, demək olar ki, şəffaf, rəngsiz mayedir.

### **Farmakoterapevtik qrupu**

Kombinə olunmuş iltihabəleyhinə və antibakterial vasitələr. Qlükokortikosteroid + antibiotik  
**ATC kodu:**S01CA01

### **Farmakoloji xüsusiyyətləri**

#### ***Farmakodinamikası***

Framisetin-sulfat – aminoqlikozid qrupu antibiotik olub, bakterisid təsir göstərir. Qızılı stafilokokklara və klinik əhəmiyyət kəsb edən əksər qrammənfi mikroorqanizmlərə (bağırsağ çöpləri, dizenteriya çöpləri, proteylər və başqaları) münasibətdə geniş antibakterial təsir spektrinə malikdir. Streptokokklara münasibətdə az effektivdir. Patogen göbələklərə, viruslara, anaerob floraya təsir etmir. Mikroorqanizmlərin framisetin-sulfata qarşı rezistentliyi zəif inkişaf edir.

Qramisidin – bakteriostatik və bakterisid təsir edir, streptokokklara və anaerob mikroorqanizmlərə qarşı aktivliyi hesabına framisidin antibiotik təsir spektrini genişləndirir. Stafilokokk əleyhinə təsir edir və framisedinin stafilokok əleyhinə təsirini gücləndirir.

Deksametazon – qlükokortikosteroiddir, iltihabəleyhinə, allergiya əleyhinə və desensibilizəedici təsir edir. İltihab mediatorlarının xaric olmasını ləngitmək, kapilyar keçiriciliyi və tosqun hüceyrələrin miqrasiyasını azaltmaqla deksametazon iltihabi prosesləri ləngidir. Gözə damızdırma zamanı ağrını, yanğını, yaşarmanı, işıqdan qorxmanı azaldır. Qulağa damızdırma zamanı xarici qulağın iltihab əlamətləri (dəri qızarması, ağrı, qaşınma, xarici qulaq keçəcəyində ağrı, qulaq tutulması hissi) azalır.

#### ***Farmakokinetikası***

Yerli istifadə zamanı sistem absorbsiya aşağıdır. Framisetin-sulfat iltihablaşmış dəridən və açıq yaradan sorula bilər. Sistem qan dövrünə düşdükdə dəyişilməmiş halda böyrəklərlə xaric olur. Yarım xaric olma müddəti 2-3 saatdır. Daxilə qəbul zamanı deksametazon mədə-bağırsaq traktından sürətlə sorulur. Yarım xaric olma müddəti 190 dəqiqədir.

### **İstifadəsinə göstərişlər**

Gözün ön hissəsinin bakterial xəstəlikləri:

- blefarit
- konyunktivit
- keratit
- iridosiklit
- sklerit, episklerit.

Göz qapağı dərisinin infeksiyalaşmış ekzeması.

Xarici qulağın iltihabı.

### **Əks göstərişlər**

- preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq
- virus və ya göbələk infeksiyası, vərəm, gözün irinli iltihabı, traxoma
- buynuz qişa epitelinin tamlığının pozulması və skleranın nazilməsi
- herpetik keratit (buynuz qişanın ağacşəkilli xorası)
- qlaukoma
- qulaq pərdəsinin deşilməsi (preparatın orta qulağa daxil olması ototoksik təsirin inkişafına səbəb ola bilər)
- hamiləlik və laktasiya dövrü
- südəmər uşaqlar.

### **Xüsusi göstərişlər**

Preparatın tərkibinə daxil olan framisetin sulfat aminoqlikozid qrupu antibiotikdir. Bu qrupa aid antibiotiklərə nefro və ototoksik təsir xasdır, bu özünü xüsusilə yüksək dozada, həmçinin qaraciyər və böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə istifadə zamanı büruzə verir. Preparatdan istifadə müddəti 7 günü aşmamalıdır, yalnız xəstəlikdə aydın müsbət dinamika halları istisna olmaqla (qlükokortikosteroid gizli keçən infeksiyanı maskalaya bilər, uzun müddət antibiotik istifadəsi davamlı mikrofloranın inkişafına səbəb ola bilər).

Gözə damızdırdıqdan sonra görmə dəqiqliyinin qısamüddətli itməsi baş verən pasiyentlərə nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə etməkdən çəkinmək lazımdır.

Damcı tökünün ucu gözə toxunmamalıdır. Flakon açıldıqdan sonra 1 ay müddətində istifadə olunmalıdır.

### **Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri**

Framisetin-sulfatın ototoksik və nefrotoksik təsir edən digər antibiotiklərlə (gentamisin, kanamisin, streptomisin, monomisin) birgə istifadə olunması məsləhət görülmür.

### **İstifadə qaydası və dozası**

Göz xəstəlikləri zamanı: yüngül gedişli infeksiyon proseslər zamanı hər 4 saatdan bir konyunktival kisəyə 1-2 damcı damızdırılır. Ağır infeksiyon proseslər zamanı preparat hər saatdan bir damızdırılır. İnfeksiyon prosesin zəifləməsinə əsasən damızdırmaların sayı azaldılır.

Qulaq xəstəlikləri zamanı: 2-3 damcı olmaqla gündə 3-4 dəfə damızdırılır. Xarici qulaq keçəcəyinə məhlulla isladılmış tənzip qoymaq olar.

**Əlavə təsirləri**

Allergik reaksiyalar (qıcıqlanma, yanğı, ağrı, qaşınma, dermatit).

Uzunmüddətli yerli təsirli qlükokortikosteroidlərdən istifadə zamanı aşağıdakılar baş verə bilər:

- qlaukoma simptomokompleksi ilə gedən gözdaxili təzyiqin qalxması (qlükokortikoid tərkibli preparatların 7 gündən artıq istifadəsi zamanı gözdaxili təzyiq müntəzəm olaraq ölçülməlidir);
- arxa subkapsulyar kataraktanın inkişafı;
- buynuz qişanın və skleranın nazikləşməsi;
- ikincili infeksiyanın qoşulması.

**Doza həddinin aşılması**

Uzunmüddətli istifadə sistem təsirlərin inkişafına səbəb ola bilər. Müalicə simptomatiktir.

**Buraxılış forması**

5 ml məhlul, sarı və ya qəhvəyi rəngli şəffaf şüşə flakonda. 1 flakon polietilen damcıökən və içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

**Saxlanma şəraiti**

25°C-dən yuxarı olmayan temperaturda, uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

**Yararlılıq müddəti**

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

**Aptekdən buraxılma şərti**

Resept əsasında buraxılır.

**İstehsalçı**

Sanofi India Limited, Hindistan.